




Evento ONDA-SINPF

Roma, 12 giugno 2024


Matteo Balestrieri
UNIVERSITÀ DI UDINE

Figura 1.4
Soddisfazione verso se stessi: trend percentuale

Nel 2022 sono stati 12.406 gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado italiane che hanno partecipato allo studio ESPAD®Italia. Il 52% è di genere femminile e quasi il 65% è minorenni.

Maschi 
Femmine 
Totale 






ESPAD®Italia - Anni 2007-2022

Figura 1.6
Soddisfazione verso la propria salute: trend percentuale

- Maschi
- Femmine
- Totale

Isolamento sociale

Figura 22.5 -
 Isolamento sociale nel
 2021 e nel 2022



- No ■
- No ma avrei voluto ■
- Si ■



PSICOFARMACI CON PRESCRIZIONE MEDICA

Il 12,7% degli studenti italiani ha utilizzato, nella vita, psicofarmaci prescritti da un medico. Questi includono i farmaci per l'umore, per dormire e/o rilassarsi e per l'iperattività e/o l'attenzione e sono stati utilizzati soprattutto dalle ragazze (18%; M=7,6%).


Nel tempo si è osservato un aumento della percentuale di studenti che hanno utilizzato psicofarmaci con prescrizione medica, specialmente dopo la pandemia da COVID-19.



ESPAD*Italia - Anni 2007 - 2022

La prevalenza del consumo di psicofarmaci va dall'11% osservato tra i 17enni e i 18enni a quasi il 15% tra i 16enni. Per tutte le età vi

sono maggiori consumi femminili con un rapporto di genere che risulta triplo tra i 17enni.




ESPAD*Italia - Anno 2022

FARMACI SENZA PRESCRIZIONE MEDICA (SPM)

Quanto è diffuso il consumo di psicofarmaci spm?

Prevalenza e trend


Totale 100%



- Consumo nella vita 18,7%
- Consumo nell'anno 10,8%
- Consumo nel mese 6,1%
- Consumo frequente 1,9%

Figura 5.2 Consumi di psicofarmaci non prescritti: trend percentuale

- Consumo nella vita
- Consumo nell'ultimo anno
- Consumo negli ultimi trenta giorni
- Consumo frequente



Motivi per l'assunzione di psicofarmaci SPM






Figura 5.4 Utilizzo di psicofarmaci non prescritti nell'ultimo anno per tipologia e genere

Femmine
Maschi

Sostanze illegali

Figura 6.1- Consumi di sostanze illecite: trend percentuale.



ESPAD


Generazione Z e comportamenti a rischio

Rapporto di Ricerca sulla diffusione dei comportamenti a rischio fra gli studenti delle scuole superiori di secondo grado.

a cura di
Silvio Biagioni
Corrado Fizzarotti
Sabrina Molinaro



CANNABINOIDI



24%

CONSUMO
NELL'ANNO

4,9%

USO A
RISCHIO

34%


ACCESSIBILITÀ

67%

PERCEZIONE
DEL RISCHIO


Figura 7.8 Età di primo uso di cannabis: trend percentuale.

14 anni o meno
15-17 anni
18 anni o più





Estimated prevalence and number of adolescents with mental disorders in Europe, 2019




1 adolescente su 7 tra i 10 e i 19 anni convive con un disturbo mentale diagnosticato




L'ansia e la depressione rappresentano il 40% dei disturbi mentali diagnosticati

Estimates of key mental disorders among adolescents in Europe, 2019


Boys and girls aged 10–19



Girls aged 10–19



Boys aged 10–19



- Anxiety and depression disorders
- ADHD
- Conduct disorder
- Bipolar disorder
- Eating disorder
- Autism spectrum disorders
- Remaining mental disorders

LE CARATTERISTICHE STRUTTURALI E LE VARIABILI DI PROCESSO DEI SERVIZI DI NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA IN ITALIA: UNO STUDIO REGIONALE

The characteristics and activities of Child and Adolescent Mental Health Services in Italy: a regional survey

Emilia-Romagna

Diagnosi (per 100,000 abitanti 0-17 anni)




Tabella 12.6.4 - Accessi in pronto soccorso che esitano in ricovero con indicazione del reparto raggruppati per gruppo diagnostico

Analisi dei dati del
Sistema Informativo per la Salute Mentale
(SISM)

Anno 2022

	Schizofrenia e altre psicosi funzionali	Mania e disturbi affettivi bipolari	Depressione	Sindromi nevrotiche e somatoformi	Disturbi della personalità e del comportamento	Alcolismo e tossicomanie	Demenze e disturbi mentali organici	Ritardo mentale	Altri disturbi psichici	Totale complessivo	%
Psichiatria	18.125	3.474	7.353	4.279	2.897	1.066	1.682	83	1.300	40.259	53,1%
Medicina generale	670	57	82	1.756	357	556	1.973	4	2.705	8.160	10,8%
Pediatria	178	23	139	535	138	126	81	8	2.004	3.232	4,3%
Chirurgia generale	4	5	2	835	260	34	37		1.373	2.550	3,4%
Allergologia	1.273	67	272	347	22	38	445	1	53	2.518	3,3%
Neurologia	316	17	10	540	122	53	305	1	684	2.048	2,7%
Ostetricia e ginecologia	6	3	4	501	96	2	10	1	1.053	1.676	2,2%
Ortopedia e traumatologia	3	21	2	691	125	48	14		736	1.640	2,2%
Geriatria	148	4	14	213	41	19	799	1	212	1.451	1,9%
Cardiologia	4			357	62	20	6		805	1.254	1,7%
Astanteria	152	13	50	326	18	195	113	2	233	1.102	1,5%
Neuropsichiatria infantile	248	14	194	185	133	30	67	2	204	1.077	1,4%
Unità coronarica	3	7		266	64	28	3		504	875	1,2%
Terapia intensiva	41	2	13	156	33	261	14		209	729	1,0%
Altri reparti	1.053	154	217	2.262	518	188	528	2	2.281	7.203	9,5%
ITALIA	22.224	3.861	8.352	13.249	4.886	2.664	6.077	105	14.356	75.774	100,0%

Fonte: NSIS - Sistema informativo emergenza urgenza (EMUR - PS) - anno 2022

Outcomes of young people who reach the transition boundary of child and adolescent mental health services: a systematic review

Rebecca Appleton¹  · Catriona Connell¹  · Emma Fairclough²  · Helena Tuomainen¹  · Swaran P. Singh¹ 

I risultati di questa revisione della letteratura indicano che solo 1/4 dei giovani è passato ai servizi per l'Adulto, mentre gli altri hanno avuto esiti diversi dopo aver lasciato i servizi per i Minori ed hanno effettuato molteplici transizioni in vari servizi.

Predictors of transitioning to adult mental health services and associated costs: a cross-country comparison

2023

Rebecca Appleton ¹, Alastair Canaway ², Helena Tuomainen ²,
 Gwen Dieleman ³, Suzanne Gerritsen ³, Mathilde Overbeek ^{4,5,6},
 Athanasios Maras ^{4,5}, Larissa van Bodegom ⁴, Tomislav Franić ⁷,
 Giovanni de Girolamo ⁸, Jason Madan ², Fiona McNicholas ^{9,10},
 Diane Purper-Ouakil ^{11,12}, Ulrike M E Schulze ^{13,14}, Sabine Tremmery ¹⁵,
 Swaran P Singh ^{2,16}

	Fell through gap	Transitioned	All
Country, n (%)			
Belgium	35 (10.42)	27 (17.76)	62 (12.71)
France	27 (8.04)	22 (14.47)	49 (10.04)
Germany	37 (11.01)	19 (12.5)	56 (11.48)
Ireland	13 (3.87)	12 (7.89)	25 (5.12)
Italy	76 (22.62)	10 (6.58)	86 (17.62)
Netherlands	61 (18.15)	23 (15.13)	84 (17.21)
UK	87 (25.89)	39 (25.66)	126 (25.82)

La più alta percentuale di giovani transitati ai Servizi per l'Adulto è in Irlanda (48%), la più bassa in Italia (12%)





CONVEGNO CONGIUNTO SINPIA-SINPF

**PSICOFARMACOLOGIA
NELL'ETÀ DI TRANSIZIONE**
Dalla teoria alla pratica clinica



EVENTO IBRIDO

16-17 maggio 2024
Cagliari